


## Chelonoides carbonaria

**Nederlandse naam:** Kolenbrander / Savanneschildpad  
**Duitse naam:** Köhlerschildkröte  
**Engelse naam:** Yellow footed tortoise



**Plaats in het dierenrijk:**

**Klasse:** Reptilia  
**Onderklasse:** Anapsida  
**Orde:** Testudines (Schildpadden)  
**Suborde:** Cryptodira (Halsbergers)  
**Familie:** Testudinidae (Landschildpadden)

**Lengte:** Tot 50 cm.

**Herkomst:** De kolenbrander komt voor in Zuid-Amerika (voornamelijk savannegebieden ten oosten en westen van de Andes).

**Terrariumtype:** Deze dieren vragen een ruim terrarium. De bodem moet iets vochtig zijn om de luchtvochtigheid op peil te houden. Als bodemmateriaal kunnen bark of hydro-korrels worden gebruikt.

**Temperatuur:** 20 - 30 °C. (dagtemperatuur)

15 - 20 °C. (nachttemperatuur)

**Voedsel:** Alle soorten bladgroenten (andijvie) en zacht fruit. Ook bloemen (paardebloemen) kunnen worden aangeboden. Van tijd tot tijd zal deze alleseter ook een stukje vlees pakken. Vooraf het voedsel bestrooien met calciumpoeder. Minimaal één keer per week een vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

**Water:** De dieren vragen een forse waterbak, waar ze eventueel in kunnen baden. Het water daarin moet dagelijks worden verversd. Tevens moet de bodem elke dag worden besproeid. Gebruik zowel voor de drinkbak als voor het sproeien lauw water. Aan het water moet regelmatig een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

**Voortplanting:** De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 20 - 40 stuks.

**Overige opmerkingen:** Synoniem gebruikte namen: *Testudo carbonaria* of *Geochelone carbonaria*. Kunnen zeer oud worden.

