


Hemitheconyx caudocinctus

Nederlandse naam: (Afrikaanse) vetstaart-gekko
Duitse naam: Afrikanischer Krallengecko
Engelse naam: Fat-tailed gecko



Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (hagedissen / slangen)
Suborde: Sauria (hagedissen)
Infraorde: Gekkota (gekkoachtigen)
Familie: Gekkonidae (gekko's)

Lengte: Tot 20 cm.

Herkomst: De Afrikaanse vetstaart-gekko komt voor in de savannes en hafwoestijnen van West-Afrika.

Terrariumtype: Deze bodemdieren vragen een woestijn-/steppen terrarium. Ze hebben zoveel mogelijk grondoppervlak nodig. Daarbij is een droge omgeving erg belangrijk. Zand is als bodembedekking aan te bevelen, liefst een dikke laag. Platte stenen kunnen worden toegevoegd. Belangrijk is ook dat de dieren een schuilgelegenheid hebben in een open steen, in open hout of in een grot. Een plek in het terrarium moet wat vochtig worden gehouden.

Temperatuur: 25 - 35 °C. (dagtemperatuur), plaatselijk warmer.
minder dan 20 °C. (nachttemperatuur)
een winterslaaperperiode van 2 maanden op een temperatuur van 10 tot 15° C. is aan te raden.

Voedsel: Grotere insecten. Sprinkhanen, krekels, vlinders e.d. kunnen als levend voer worden aangeboden. Wormen kunnen als aanvulling worden gegeven. Voer deze altijd in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

Water: De dieren vragen een kleine waterbak. Dagelijks moet het water worden ververs. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 2 stuks.

Overige opmerkingen:

