


## Agalychnis callidryas

**Nederlandse naam:** Roodoogboomkikker (maki)  
**Duitse naam:** Rotaugenlaubfrosch  
**Engelse naam:** Red-eyed treefrog



**Plaats in het dierenrijk:**

**Klasse:** Amphibia  
**Onderklasse:** Anuromorpha (kikkvorsachtigen)  
**Orde:** Anura (Salientia) (kikkers en padden)  
**Suborde:** Procoela  
**Infraorde:** -  
**Familie:** Hylidae (boomkikkers)

**Lengte:** Tot 7 cm.

**Herkomst:** De roodoogboomkikker komt zowel in bergwouden als in lager gelegen bossen in Midden-Amerika voor.

**Terrariumtype:** Deze dieren vragen een rijk beplant terrarium met een zeer hoge luchtvochtigheid. De bodem moet vochtig zijn. Als materiaal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Een waterpartij en/of een regeninstallatie zijn aan te bevelen. Er moet wel goed worden gelet op schimmelvorming. Een paludarium vorm is ook mogelijk.

**Temperatuur:** 23 - 27 °C. (dagtemperatuur)

20 - 25 °C. (nachttemperatuur)

**Voedsel:** Kleinere insecten. Krekels, vliegen, weideplankton, kleine treksprinkhanen kunnen worden gevoerd. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

**Water:** De dieren hebben geen waterbak nodig. Wel moeten ze elke dag worden besproeid met lauwwarm water. Eén keer per week moet aan het sproeiwater een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

**Voortplanting:** De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt enkele tientallen. Het mannetje is kleiner als het vrouwtje.

**Overige opmerkingen:** Een dier dat pas 's nachts tot leven komt en overdag verborgen leeft.

