


## Bufo valliceps

**Nederlandse naam:** Golfkustpad  
**Duitse naam:** Golfkröte  
**Engelse naam:** Gulf coast toad



**Plaats in het dierenrijk:**

**Klasse:** Amphibia  
**Onderklasse:** Anuromorpha (kikvorsachtigen)  
**Orde:** Anura (Salientia) (kikkers en padden)  
**Suborde:** Procoela  
**Familie:** Bufonidae (echte padden)

**Lengte:** Tot 10 cm.

**Herkomst:** De golfkustpad komt voor in Noord-Amerika: rond de golf van Mexico.

**Terrariumtype:** Deze dieren vragen een vochtig terrarium. De dikke bodemlaag moet vochtig zijn om de luchtvochtigheid op peil te houden. Als bodemmateriaal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Van hout of ander materiaal moeten schuilplaatsen worden gemaakt.

**Temperatuur:** 25 - 30 °C. (dagtemperatuur)

15 - 20 °C. (nachttemperatuur)

**Voedsel:** Kleinere insecten. Krekels, vliegen, weideplankton, kleine treksprinkhanen, buffalo- en meelwormen kunnen worden gevoerd. Bij meelwormen oppassen met oudere exemplaren vanwege het te harde chitine-schild. Wormen in het algemeen niet gebruiken als hoofdvoedsel en altijd voeren in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water'). Het zijn flinke eters.

**Water:** De dieren vragen een grote waterbak. Dagelijks moet het water worden ververs. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

**Voortplanting:** De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt enkele duizenden stuks.

**Overige opmerkingen:** De bodemlaag moet regelmatig worden ververs (ammoniakgeur dient als waarschuwingsteken). Eigenlijk vooral 's nachts actief, maar ze komen overdag wel op voer af.

