

Kassina senegalensis

Nederlandse naam: Afrikaanse renkikker
Duitse naam: Senegal-Rennfrosch
Engelse naam: Senegal running frog / kassina



Plaats in het dierenrijk:
Klasse: Amphibia
Onderklasse: Anuromorpha (kikvorsachtigen)
Orde: Anura (Salientia) (kikkers en padden)
Suborde: Diplasiocoela
Familie: Rhacophoridae (schuimnestboomkikkers)

Lengte: Tot 4 cm.

Herkomst: De Afrikaanse renkikker komt voor in de savannegebieden van Afrika.

Terrariumtype: Deze dieren vragen een vochtig terrarium met veel klimtakken en stronken. Let op een goede bevestiging van het materiaal. De bodem moet goed vochtig zijn om de luchtvochtigheid op peil te houden. Als bodemmateriaal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Het terrarium mag ook iets hoger zijn.

Temperatuur: 24 - 30 °C. (dagtemperatuur)

20 - 25 °C. (nachttemperatuur)

Voedsel: Kleinere insecten. Krekels, vliegen, weideplankton, kleine treksprinkhanen, buffalo- en meelwormen kunnen worden gevoerd. Bij meelwormen oppassen met oudere exemplaren vanwege het te harde chitine-schild. Wormen in het algemeen niet gebruiken als hoofdvoedsel en altijd voeren in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren bestrooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

Water: De dieren vragen een grote waterbak. Het water daarin moet dagelijks worden verversd. Tevens moeten de dieren elke dag worden besproeid. Gebruik zowel voor de drinkbak als bij het sproeien lauw water. Eén keer per week moet aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt enkele tientallen stuks.

Overige opmerkingen: Vooral 's nachts actief. Deze kikkers springen zelden.

