

Heterodon nacisus

Nederlandse naam: Westelijke haakneusslang
Duitse naam: Westliche Hakennatter
Engelse naam: Western hog-nosed snake



Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (Hagedissen / slangen)
Suborde: Serpentes (Slangen)
Infraorde: Caenophidia
Familie: Colubridae (Ringslangachtigen)
Onderfamilie: Xenodontinae (Slagtandslangen)

Lengte: Tot 80 cm.

Herkomst: De westelijke haakneusslang komt voor in Noord-Amerika: Zuid-Canada tot Noord-Mexico

Terrariumtype: Deze dieren vragen een woestijnterrarium. Veel grondoppervlak (zand) in een dikke laag, want de slangen graven graag. Daarbij kan ook klimgelegenheid in de vorm van stenen. Daarbij moet er goed op worden gelet dat deze goed vast liggen en niet kunnen kantelen of vallen! In het algemeen moet het terrarium droog worden gehouden.

Temperatuur: 25 - 35 °C. (dagtemperatuur)

15 - 20 °C. (nachttemperatuur)

Voedsel: Dit dier eet eventueel levende warmbloedige dieren: muizen, hamsters, cavia's, gerbils kunnen worden aangeboden. Kikkers en padden hebben als voedsel de voorkeur. Calcium of vitamines hoeven bij deze prooidieren niet te worden bijgevoerd, behalve als bepaalde ziekten worden geconstateerd. De grootte van het prooidier: houd 1½ keer de bekbreedte aan.

Water: De dieren vragen een grote waterbak. Dagelijks moet het water worden ververs. Gebruik altijd lauw water. Eén keer per week kan aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 5 tot 40 stuks.

Overige opmerkingen: De slang gedraagt zich bij gevaar als een cobra door de ribben te spreiden. Een andere verdediging is het dood liggen op de rug. Om de dieren tot voortplanting te brengen moeten ze vooraf gedurende een periode van ca. 8 weken op een temperatuur tussen 10 en 15 °C worden gehouden met dagelijks een kortere lichtperiode.

