

Lampropeltis triangulum annulata

Nederlandse naam: Mexicaanse melkslang
Duitse naam: Kettennatter
Engelse naam: Mexican scarlet kingsnake



Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (hagedissen / slangen)
Suborde: Serpentes (slangen)
Infraorde: Caenophidia
Familie: Colubridae (ringslangachtigen)
Onderfamilie: Colubrinae

Lengte: Tot ca 60 cm.

Herkomst: Zuidoosten van de Verenigde Staten tot equador.

Terrariumtype: Deze dieren vragen een rotterrarium. Naast veel grondoppervlak (zand) moeten ze ook wat klim- en schuilgelegenheid hebben in de vorm van stenen en stronken. De klimmogelijkheden moeten ook een zonplaats kunnen bieden. In het algemeen moet het terrarium droog worden gehouden.

Temperatuur: 25 - 35 °C. (dagtemperatuur)

15 - 20 °C. (nachttemperatuur)

Voedsel: Dit dier eet levende warmbloedige dieren: muizen, ratten, hamsters, cavia's, gerbils of kleine (loop-)vogels kunnen worden aangeboden. Daarnaast allerlei amfibieën en reptielen. Calcium of vitamines hoeven bij deze prooidieren niet te worden bijgevoerd, behalve als bepaalde ziekten worden geconstateerd. De grootte van het prooidier: houd 1½ keer de bekbreedte aan.

Water: De dieren vragen een grote waterbak, ook om daarin te kunnen baden. Dagelijks moet het water worden ververs. Gebruik altijd lauw water

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 6 tot 25 stuks.

Overige opmerkingen: Vooral in de schemering en 's nachts actief. Is een mimicry (nabootsing) van de giftige koraalslang (Micrurus), maar de rode en witte kleur worden gescheiden door zwarte banden. Om de dieren tot voortplanting te brengen moeten ze vooraf gedurende een periode van ca. 8 weken op een temperatuur tussen 10 en 15 °C worden gehouden met dagelijks een kortere lichtperiode.

